FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

ACCUDO® XTS

BIOESTIMULANTE

EL AGENTE ES UN CONCENTRADO HIDROSOLUBLE

INGREDIENTE ACTIVO:

Ingredientes activos (cepa)	Contenido en g/l	Contenido mínimo en UFC/ml
Bacillus paralicheniformis RTI184	26	$3{,}85 \times 10^{09}$

PARA USO EN INVERNADEROS:	TOMATE, PEPINO, PIMIENTO, FRESA, LECHUGA, MELÓN, SANDÍA, CALABAZA, BERENJENA, COL, COLIFLOR Y BRÓCOLI
PARA USO AL AIRE LIBRE:	FRESAS, LECHUGAS, PATATAS, COL, PEPINO, PIMIENTO, MELÓN, SANDÍA, CENTENO, CEBADA, MAÍZ, COLZA, ALMENDRAS, UVAS, CÍTRICOS, TOMATE, COLIFLOR, BRÓCOLI, CALABACÍN, BERENJENA, CALABAZA

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

INSTRUCCIONES DE USO:

FORMA DE ACTUACIÓN:

Accudo® XTS es un bioestimulante de base biológica, que puede utilizarse por empapado (*drench*) y en riego por goteo en hortalizas y árboles frutales cultivados en suelo. Además, el producto puede aplicarse en los surcos del campo de patatas y como preparación de las semillas en diversos cultivos agrícolas al aire libre.

Accudo® XTS contiene esporas vivas de una cepa patentada de *Bacillus paralicheniformis* (cepa RTI184).

La cepa RTI184 de *Bacillus paralicheniformis* se extrae de las raíces del arroz cultivado en California y es una bacteria natural no modificada genéticamente.

Las esporas de Accudo® XTS germinan en contacto con las raíces de las plantas en crecimiento y las células vegetativas emergentes de la bacteria colonizarán posteriormente las raíces, dando lugar a la formación de biopelículas. Se sabe que el *Bacillus paralicheniformis* desempeña un papel importante en la rizosfera de las plantas.

La relación entre el organismo y la planta se traduce en un mejor enraizamiento de las plantas, así como en un aumento general de la vitalidad y de la biomasa de las plantas. Estos efectos se manifiestan en etapas posteriores en un rendimiento superior. Además, Accudo® XTS favorece, la emergencia de plántula a partir de las semillas y tubérculos. También protege al cultivo del estrés abiótico, como la sequía o el estrés por herbicidas. La fisiología de las plantas y los estudios genéticos han demostrado que estos efectos se basan en la producción bacteriana y la liberación de moléculas hormonales que estimulan la salud y el crecimiento de las plantas. Además, la cepa RTI184 del *Bacillus paralicheniformis*posee grupos de genes relacionados con la mejora de la absorción de nutrientes del suelo por parte de la planta.

Cultivos	**Ventajas de** Accudo® XTS
Tomate Pepino Pimiento Fresa Lechuga Coles Coliflor Brócoli Calabacines Berenjenas Calabaza Melón Sandías Patatas	• Mejor desarrollo de las raíces y los brotes • Mayor eficiencia del consumo del agua • Mayor vitalidad del cultivo • Incremento del rendimiento comercial en un 5%
Centeno Cebada Maíz Colza	• Mejor implantación de cultivos • Mayor tolerancia al estrés abiótico • Mejor establecimiento de plántulas/plantas
Almendro Cítricos	• Mejora del desarrollo radicular.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Uva de mesa Uva de vinificación	• Mayor eficiencia en el uso del agua • Mayor vitalidad del cultivo • Mayor tolerancia al estrés abiótico

La dosis de aplicación de Accudo® XTS es de 0,5 l/ha en caso de aplicarse en riego por goteo en hortalizas y para la aplicación en surcos en patatas.

Para la aplicación por empapado (*drench*), debe considerarse una dosis de 50 ml/1000 plantas.

Para el tratamiento de las semillas, véase la sección C.

Para almendros, cítricos y uvas, Accudo® XTS se aplica a 1 l/ha en riego por goteo

Instrucciones de uso

Aplicación y dosis

A) Hortalizas

En las hortalizas, Accudo® XTS se aplica por empapado (*drench*) o en riego por goteo.

La aplicación por empapado (*drench*) puede realizarse en la fase de esqueje o en el momento del trasplante. Después del transplante, Accudo® XTS puede aplicarse a través del sistema de riego por goteo.

En cuanto a las aplicaciones por empapado (*drench*), los principales métodos de aplicación son:

- Aplicación mediante pulverizadores de barra clásicos, seguida de riego para lavar Accudo® XTS hasta la zona radicular.
- Aplicación con regadera.
- Fertirrigación

La aplicación por empapado (*drench*) depende de la cantidad de líquido que las plantas pueden absorber. El volumen de agua debe determinarlo cada agricultor tras una prueba.

En caso de riego por goteo, el producto se aplicará de la manera más uniforme posible alrededor de la base de la planta para garantizar una translocación uniforme hasta las raíces.
El volumen de agua que se utiliza en el riego por goteo depende de la cantidad de agua que ese sistema de riego por goteo utilice, al regar el cultivo.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha		Plazo de seguridad (PS)
		l /ha	UFC /ha	
• Invernadero y aire libre: Tomate, pimiento, berenjena, pepino, melón, sandía, calabacín, calabaza, lechuga, col, coliflor, brécol	Riego por goteo	0,5	$1,9 \times 10^{12}$	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 2				
Momento de aplicación: • Primera aplicación: 0-6 días después de la siembra. • Segunda aplicación: 2-4 semanas después de la primera aplicación.				
Instrucciones de uso: El producto debe aplicarse alrededor de la base de la planta de la forma más uniforme posible. Un riego adecuado es importante para asegurar que el producto entre en contacto estrecho y continuo con las raíces. Se recomienda humedecer el suelo antes de aplicar Accudo® XTS con el sistema de riego por goteo. Una vez aplicado el tratamiento líquido, es necesario proceder a la limpieza íntegra de las mangueras de riego y, seguidamente, regar durante el tiempo necesario para proporcionar a las plantas la humedad necesaria para su crecimiento. En este último paso es necesario evitar la eliminación del producto de la zona de las raíces.				

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha		Plazo de seguridad (PS)
		l /ha	UFC /ha	
• Invernadero y aire libre: Fresa	Riego por goteo	0,5	$1,9 \times 10^{12}$	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 2-4				
Momento de aplicación: • Primera aplicación: 0-6 días después de la siembra. • Segunda aplicación: 2-4 semanas después de la primera aplicación. • Tercera aplicación al rebrotar en primavera (durante la floración). • Cuarta aplicación: 2-4 semanas después de la tercera aplicación.				
Instrucciones de uso: El producto debe aplicarse alrededor de la base de la planta de la forma más uniforme posible. Un riego adecuado es importante para garantizar que el producto entre en contacto estrecho y continuo con las raíces. Se recomienda humedecer el suelo antes de aplicar Accudo® XTS con el sistema de riego por goteo. Una vez aplicado el tratamiento, es necesario proceder a la limpieza íntegra de las mangueras de riego y, seguidamente, regar				

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

durante el tiempo necesario para proporcionar a las plantas la humedad necesaria para su crecimiento. En este último paso es necesario evitar la eliminación del producto de la zona de las raíces.

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha		Plazo de seguridad (PS)
		l/ha	UFC /ha	
• Invernadero y aire libre: Tomate, pimiento, berenjena, pepino, melón, sandía, calabacín, calabaza, lechuga, col, fresa, coliflor, brócoli	por empapado (*drench*)	0,5	$1,9 \times 10^{12}$	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 1				
Momento de aplicación: • En la fase de vivero antes de trasplantar las plántulas o en el trasplante.				
Instrucciones de uso: Para la aplicación por empapado (drench), se recomiendan 50 ml de producto por cada 1.000 alveolos o plántulas, asegurándose de que todo el preparado que contiene el producto es absorbido por las plántulas. La dosificación se basa en una densidad de siembra de 10.000 plantas/ha. Para densidades de plantación diferentes, la dosis de Accudo® XTS puede ajustarse en consecuencia para que coincida con la dosis máxima de 0,5 l/ha. Se recomienda continuar la aplicación de Accudo® XTS después del transplante mediante una aplicación de riego por goteo a las 2-4 semanas después del transplante (para las fresas de segunda floración se recomiendan otras 2 aplicaciones por goteo en primavera, respectivamente).				

B) Patatas

En patata, Accudo® XTS se aplica en los surcos, durante la aplicación de los tubérculos. Las boquillas del equipo de pulverización deben situarse en el tubérculo caído, así como en el suelo circundante, para garantizar una distribución única del producto en la superficie del tubérculo. El volumen de aplicación puede adaptarse a las necesidades locales y al equipo, y suele oscilar entre 150-400 l/ha.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha		Plazo de seguridad (PS)
		l/ha	UFC /ha	
Patatas	Aplicación en surcos	0,5	$1,9 \times 10^{12}$	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 1				
Momento de aplicación: • Al plantar los tubérculos				
Instrucciones de uso: Aplicación de Accudo® XTS durante la plantación de los tubérculos. Las boquillas deben situarse hacia el tubérculo caído y el suelo circundante para garantizar una distribución única del producto en la superficie del tubérculo.				

C) Tratamiento de semillas

Accudo® XTS es apropiado para el tratamiento de semillas de centeno, cebada, colza y maíz.

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha	Plazo de seguridad (PS)
		l/100 kg semillas	
Maíz	Tratamiento de semillas	0,0175	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 1			
Momento de aplicación: Tratamiento de las semillas antes de la siembra			
1 unidad de siembra = 50.000 semillas. Instrucciones de uso: Accudo® XTS es un producto listo para usar y puede diluirse en agua. También se pueden añadir a la dilución otros productos para el tratamiento de semillas, como fungicidas o colorantes adherentes. Previamente, se deberá preparar una muestra de la mezcla. Al utilizarla, asegúrese de que la solución de tratamiento esté bien mezclada. La solución puede realizarse en cualquier equipo de tratamiento de semillas siguiendo las instrucciones del fabricante. El equipo debe estar limpio de cualquier residuo de otros productos, por lo que es imprescindible limpiarlo antes de utilizarlo. Para evitar una dosificación incorrecta, debe comprobarse el ajuste de vez en cuando la configuración del equipo. Recomendamos una cantidad de líquido de tratamiento entre 500 y 800 ml/100 kg de semillas.			

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha L /unidad de semillas	Plazo de seguridad (PS)
Centeno y Cebada	Tratamiento de las semillas	0,05-0,1	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 1			
Momento de aplicación: Tratamiento de las semillas antes de la siembra (BBCH 00)			
Instrucciones de uso: Accudo® XTS es un producto listo para usar y puede diluirse en agua. También se pueden añadir a la dilución otros productos para el tratamiento de semillas, como fungicidas o colorantes adherentes. Previamente, se deberá preparar una muestra de la mezcla. Al utilizarla, asegúrese de que la solución de tratamiento esté bien mezclada. La solución puede realizarse en cualquier equipo de tratamiento de semillas siguiendo las instrucciones del fabricante. El equipo debe estar limpio de cualquier residuo de otros productos, por lo que es imprescindible limpiarlo antes de utilizarlo. Para evitar una dosificación incorrecta, debe comprobarse el ajuste de vez en cuando la configuración del equipo. Recomendamos una cantidad de líquido de tratamiento entre 500 y 800 ml/100 kg de semillas.			

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha l o kg F.P./unidad de semillas	Plazo de seguridad (PS)
Colza	Tratamiento de las semillas	0,0315	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 1			
Momento de aplicación: Tratamiento de las semillas antes de la siembra			
Instrucciones de uso: 1 unidad de semillas = 700.000 semillas Instrucciones de uso: Accudo® XTS es un producto listo para usar y puede diluirse en agua. También se pueden añadir a la dilución otros productos para el tratamiento de semillas, como fungicidas o colorantes adherentes. Previamente, se deberá preparar una muestra de la mezcla. Al utilizarla, asegúrese de que la solución de tratamiento esté bien mezclada. La solución puede realizarse en cualquier equipo de tratamiento de semillas siguiendo las instrucciones del fabricante. El equipo debe estar limpio de cualquier residuo de otros productos, por lo que es imprescindible limpiarlo antes de utilizarlo. Para evitar una dosificación incorrecta, debe comprobarse el ajuste de vez en cuando la configuración del equipo. Recomendamos una cantidad de líquido de tratamiento entre 500 y 800 ml/100 kg de semillas.			

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

D) Almendras

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha		Plazo de seguridad (PS)
		L/ha	CFU/ha	
Almendras	Riego por goteo	1	$3{,}85 \times 10^{12}$	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 2-3				
Momento de aplicación: 1ª aplicación: 20% flores abiertas (BBCH 62) 2ª aplicación: Fin de la floración - caída de los pétalos (BBCH 69) 3ª aplicación: Crecimiento del ovario (BBCH 71)				
Modo de empleo: Accudo® XTS debe aplicarse lo más uniformemente posible alrededor de la base de la planta. Es importante proporcionar un riego adecuado para garantizar que el producto entre en contacto estrecho y persistente con las raíces. Se recomienda humedecer el suelo antes de aplicar Accudo® XTS a través del sistema de riego por goteo. Después de la aplicación con el líquido de tratamiento, el equipo de riego debe estar completamente limpio, y a continuación, hacer un riego durante el periodo necesario para proporcionar a las plantas la humedad necesaria para crecer. Durante la última etapa, se debe evitar la lixiviación del líquido de tratamiento de la zona radicular.				

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

E) Uva de mesa y uva de vinificación

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha		Plazo de seguridad (PS)
		L/ha	CFU/ha	
Uva de mesa y uva de vinificación	Riego por goteo	1	$3{,}85 \times 10^{12}$	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 2-3				
Momento de aplicación: 1ª aplicación: Inicio de la brotación (BBCH 9) 2ª aplicación: Floración (BBCH 65) 3ª aplicación: Baya del tamaño de un guisante (BBCH 75)				
Modo de empleo: Accudo® XTS debe aplicarse lo más uniformemente posible alrededor de la base de la planta. Es importante riego adecuado para que el producto entre en contacto estrecho y persistente con las raíces. Se recomienda humedecer el suelo antes de aplicar Accudo® XTS a través del sistema de riego por goteo. Después de la aplicación con el líquido de tratamiento, el equipo de riego debe estar completamente limpio, y a continuación, hacer un riego durante el periodo necesario para proporcionar a las plantas la humedad necesaria para crecer. Durante la última etapa, se debe evitar la lixiviación del líquido de tratamiento de la zona radicular.				

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

F) Cítricos

Cultivos	Método de aplicación	Dosificación del producto por ha		Plazo de seguridad (PS)
		L/ha	CFU/ha	
Cítricos	Riego por goteo	1	$3{,}85 \times 10^{12}$	No procede
N.º máximo de aplicaciones: 2-3				
Momento de aplicación: 1ª aplicación: Inicio de la brotación (BBCH 10-15) 2ª aplicación: Floración-final de la floración (BBCH 61-65) 3ª aplicación: Desarrollo temprano de los frutos BBCH 72-75)				
Modo de empleo: Accudo® XTS debe aplicarse lo más uniformemente posible alrededor de la base de la planta. Es importante riego adecuado para que el producto entre en contacto estrecho y persistente con las raíces. Se recomienda humedecer el suelo antes de aplicar Accudo® XTS a través del sistema de riego por goteo. Después de la aplicación con el líquido de tratamiento, el equipo de riego debe estar completamente limpio, y a continuación, hacer un riego durante el periodo necesario para proporcionar a las plantas la humedad necesaria para crecer. Durante la última etapa, se debe evitar la lixiviación del líquido de tratamiento de la zona radicular.				

Preparación del líquido de pulverización

Limpie siempre todo el equipo de aplicación antes de utilizar Accudo® XTS.
Siga los procedimientos de limpieza indicados en el etiquetado del producto que ha sido pulverizado previamente.

- Añada la cantidad necesaria de Accudo® XTS al depósito de riego, que deberá llenar de agua hasta 1/4 parte o hasta la mitad.
- Utilice únicamente la cantidad específica de producto.
- Llene el depósito con la cantidad de agua restante.
- Durante el riego, mantenga en funcionamiento el agitador.

Si añade otro producto a la mezcla del tanque, añada primero Accudo® XTS y, después, el otro producto.

RESTRICCIONES

La germinación de las esporas de *Bacillus paralicheniformis* (RTI184) se detiene si el suelo alcanza temperaturas inferiores a 10° C y alcanza su nivel óptimo a los 30° C. La temperatura máxima de crecimiento del *Bacillus paralicheniformis* oscila entre los 50 y los 55°C. El pH óptimo del suelo oscila entre 5,7 y 6,8, pero no se ha informado de ningún límite de pH para el rendimiento de Accudo® XTS.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

PLAZO DE SEGURIDAD

El plazo de seguridad está cubierto por las condiciones de uso o el período de vegetación entre la aplicación y la cosecha.

Bandas de seguridad

El *Bacillus paralicheniformis* es una bacteria que se encuentra en la naturaleza, por lo que las bandas de seguridad no son necesarias.

Protección del agua

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.

No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Limpie todos los componentes del equipo de aplicación. Vacíe el tanque. Elimine las aguas residuales con arreglo a la normativa local.

Una vez finalizada la aplicación, enjuague bien las mangueras, barras, filtros y boquillas con agua limpia para reducir el riesgo de formación de depósitos, ya que pueden resultar difíciles de eliminar

Cultivos en situación de estrés

El *Bacillus paralicheniformis* RTI 184 puede aumentar la vitalidad de las plantas, incluso en condiciones adversas. Por este motivo, puede aplicarse Accudo® XTS si las plantas están en situación de estrés debido a sequía, deficiencia de nutrientes, daños causados por los productos fitosanitarios u otras condiciones adversas que reducen el crecimiento de los cultivos.

Temperatura

La germinación del *Bacillus paralicheniformis* (RTI184) se vuelve inactiva a temperaturas del suelo inferiores a 10° C y alcanza su nivel óptimo a los 30° C, con una temperatura máxima de crecimiento para el *Bacillus paralicheniformis* entre los 50 - 55°C. El pH óptimo del suelo se sitúa entre 5,7- 6,8, pero no se han notificado límites para el rendimiento de Accudo® XTS

pérdida de la cosecha/ cosechas posteriores

El uso de Accudo® XTS con arreglo a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) no pone en peligro los cultivos siguientes en rotación y no requiere instrucciones de uso.

Resistencia

El *Bacillus paralicheniformis* (RTI184) no tiene propiedades fungicidas o bactericidas. Además, hasta la fecha no se ha desarrollado una resistencia contra el *Bacillus paralicheniformis*. Por tanto, el riesgo de desarrollo de resistencia es bajo y no se estima necesario introducir estrategias de gestión.

Protección integrada de las plantas

FMC apoya el uso de programas de Gestión Integrada de Plagas (GIP) para el control de plagas/enfermedades/malas hierbas. Este producto puede utilizarse como parte del programa de GIP, que puede incluir: prácticas biológicas, culturales y genéticas, pero también la aplicación de fertilizantes destinados a evitar daños económicos debidos a las plagas, las enfermedades y las malas hierbas.

Compatibilidad

Aplicaciones de mezclas

Accudo® XTS es físicamente compatible con una serie de herbicidas, insecticidas, fertilizantes y micronutrientes. La mezcla de varios productos puede producir interacciones imprevisibles. Por lo tanto, se recomienda realizar una pequeña prueba de compatibilidad antes de mezclar el

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

producto. Accudo® XTS es biológicamente incompatible con productos que contengan agentes de mezcla fuertemente, ácidos/alcalinos. Debe evitarse mezclar Accudo® XTS con este tipo de productos.

aplicación con pulverizador, limpieza

Preparación del equipo de pulverización
Antes de utilizar Accudo® XTS, asegúrese de que el equipo de pulverización esté limpio y libre de depósitos de anteriores productos fitosanitarios. Después de utilizar el equipo, límpielo a fondo.
Siga el procedimiento de limpieza que se indica en la etiqueta del producto que ha sido pulverizado previamente.
Al preparar las mezclas, añada siempre primero Accudo® XTS al líquido de pulverización. Tenga en cuenta el apartado relativo a la compatibilidad de Accudo® XTS.
Procedimiento de limpieza
Cuando limpie el equipo, siga todas las medidas de seguridad necesarias. Evite la limpieza en las inmediaciones de pozos, fuentes de agua o vegetación. Limpie todos los componentes del equipo de aplicación. Vacíe el tanque. Elimine las aguas residuales con arreglo a la normativa local.
Una vez finalizada la aplicación de Accudo® XTS, enjuague bien las mangueras, barras, filtros y boquillas con agua limpia para reducir el riesgo de formación de depósitos, ya que pueden resultar difíciles de eliminar.
Indicaciones de seguridad

El producto no se considera peligroso para la salud. No obstante, manipule el producto con la atención que requiere la manipulación de productos químicos.

P102. Mantener fuera del alcance de los niños
P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH401: Para evitar riesgos a la salud de las personas y del medio ambiente, se deben seguir las instrucciones de uso.
Protección del operario
Evite cualquier contacto con el producto.
Un uso inadecuado puede poner en riesgo su salud.
Almacenar fuera del alcance de los niños.
Equipos de protección personal
Las presentes instrucciones de seguridad se refieren principalmente a la manipulación del producto sin diluir y a la preparación de la mezcla de pulverización, aunque también se recomienda seguir estas instrucciones al aplicar el producto.
Equipo de protección respiratoria: Si el producto se manipula correctamente, la exposición ambiental es muy poco probable, pero en caso de que el vertido del material se realice de manera incorrecta y de que, a consecuencia de ello, se genere vapor o niebla pesada, los trabajadores deberán utilizar respiradores autorizados con un tipo de filtro universal que incluya un filtro de partículas.
Utilice guantes de protección: Utilice guantes de protección química, como los laminados de barrera, caucho butílico o caucho de nitrilo. Se recomienda limitar el trabajo manual.
Protección ocular: Utilice gafas de seguridad o de protección. Se recomienda tener una botella de agua a mano para enjuagar los ojos en los lugares de trabajo donde existe la posibilidad de que el producto entre contacto con los ojos.
Otra protección de la piel: Lleve ropa de protección química, que variará en función del grado de exposición, para evitar el contacto con la piel.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Primeros auxilios:
-Inhalación: Si siente malestar, retírese inmediatamente del lugar de exposición. Acuda al médico si el malestar persiste.
-Contacto con la piel: Quítese la ropa y el calzado sucios. Lávese con agua y jabón. Acuda al médico si se presentan síntomas.
-Contacto con los ojos: enjuáguese inmediatamente los ojos con agua abundante o con una solución para el enjuague de los ojos. Abra de vez en cuando los párpados hasta que no quede ningún residuo químico. Quítese las lentes de contacto después de unos minutos y aclare de nuevo los ojos. Acuda al médico si siente irritación ocular.
-Ingestión: No se aconseja provocar el vómito. Enjuáguese la boca y beba unos cuantos vasos de agua o leche. Si se producen vómitos, enjuáguese la boca y vuelva a beber líquidos. Busque atención médica.

Almacenamiento y eliminación

Almacenamiento

Conserve el producto en su embalaje original. Manténgalo alejado del calor. Almacene el producto en un lugar fabricado con material ignífugo, cerrado, seco, ventilado y con suelo impermeable, sin acceso a personas no autorizadas o niños. Utilice el espacio únicamente para almacenar productos químicos. No almacene en ese espacio alimentos, bebidas, piensos ni semillas. El espacio deberá contar con un grifo para lavarse las manos. Cierre bien la tapa del recipiente tras una aplicación parcial.
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y FMC le recomienda que utilice el producto en los 2 años siguientes a la fecha de producción.

Eliminación del producto

Al eliminar el producto, no contamine agua ni alimentos humanos o de animales. Los residuos derivados del uso del producto pueden eliminarse en el lugar en el que se ha utilizado o en un vertedero autorizado.

GESTIÓN DE ENVASES
Aclare el envase.
Elimine los envases vacíos en un vertedero autorizado con arreglo a la normativa gubernamental y local.



Enjuague enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO

OTRAS RECOMENDACIONES

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH401: Para evitar riesgos a la salud de las personas y del medio ambiente, se deben seguir las instrucciones de uso.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los usuarios profesionales tendrán acceso a una ficha de datos de seguridad.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc) La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.