FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España
+34 915 530 104
fmcagro.es

DEDALO® WG

Fungicida para el control de enfermedades fúngicas en olivo, vid y frutales de pepita al aire libre y en solanáceas y fresal en invernadero.
Granulado dispersable en agua (WG)

GRUPO	11	FUNGICIDA

Composición:
Kresoxim-metil……. 50% p/p (500 g/kg)

EUH208: Contiene la impureza formaldehído (CAS 50-00-0). Puede provocar una reacción alérgica.

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitarios con el n.º 21.603

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES EN LUGARES NO DESTINADOS AL PÚBLICO EN GENERAL (ÁMBITO CULTIVOS Y PLANTACIONES AGRÍCOLAS).

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Registrado por:
BASF Agricultural Solutions Spain SLU
Can Rabia, 3-5, plta.5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

Distribuido por:
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS, SAU.
Pº de la Castellana nº 257 5º -
28046 MADRID
-Tel. 915 530 104 www.fmcagro.es

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Sangría: Izquierda: 10,25 cm, Primera línea: 0 cm
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 48 pto, Negrita, Color de subrayado: Automático, Color de fuente: Automático, Comprimido 0,1 pto
Con formato: Fuente: Negrita, Español (España)
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri, 48 pto, Negrita, Color de subrayado: Automático, Color de fuente: Automático, Comprimido 0,1 pto
Con formato: Normal, Sangría: Izquierda: 0 cm
Con formato: Fuente: 13 pto
Con formato: LineSpacing_small
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Interlineado: sencillo
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Fuente: 9 pto
Con formato: Color de fuente: Automático, Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Sin Resaltar
Con formato: Espacio Después: 0 pto
Con formato: Español (España)
Con formato: Espacio Después: 0 pto
Con formato: Normal
Con formato: Español (España)

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España
+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: 3J72-40UN-H002-NCD7



ATENCIÓN

H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 Evitar respirar- el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P391 Recoger el vertido.
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente -de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

EUH208: Contiene la impureza formaldehído (CAS 50-00-0). Puede provocar una reacción alérgica.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES, Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Sangría: Izquierda: 10,25 cm, Primera línea: 0 cm
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Color de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: Sin Negrita, Color de fuente: Texto 1
Con formato: CLP_ToxBox_Body_Bold
Con formato: Español (España)
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Color de fuente: Texto 1
Con formato: Español (España)
Con formato: Español (España)
Con formato: Color de fuente: Texto 1
Con formato: Color de fuente: Texto 1
Con formato: Sangría: Izquierda: -0,25 cm, Primera línea: 0,25 cm
Con formato: Color de fuente: Texto 1
Con formato: Color de fuente: Texto 1
Con formato: Color de fuente: Texto 1
Con formato: Español (España)

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España
+34 915 530 104
fmcagro.es

contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Seguridad del aplicador:

Para aplicaciones al aire libre mediante pulverización normal con tractor, en las operaciones de mezcla/carga, limpieza y mantenimiento será necesario emplear guantes de protección química y ropa de trabajo. En aplicación se deberá emplear ropa de trabajo.
Para aplicaciones en invernadero mediante pulverización manual con lanza, en las operaciones de mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento será necesario emplear guantes de protección química y ropa de trabajo.

Seguridad del trabajador:

El trabajador deberá emplear ropa de trabajo para todas las tareas tanto al aire libre como en invernadero.
Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES



Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Sangría: Izquierda: 10,25 cm, Primera línea: 0 cm
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Fuente: Negrita, Sin subrayado, Color de subrayado: Automático
Con formato: Fuente: Negrita, Sin subrayado, Color de subrayado: Automático
Con formato: Color de fuente: Texto 1, Sin Tachado
Con formato: Español (España)
Con formato: Español (España)

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España
+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS

DEDALO® WG es un fungicida que contiene la sustancia activa Kresoxim-metil, perteneciente a la familia de las estrobilurinas que posee un amplio espectro contra oídio, moteado y otros hongos en una variedad de cultivos. DEDALO® WG proporciona una acción preventiva, curativa y erradicante, que provoca la inhibición de la respiración mitocondrial y actúa inhibiendo la germinación de las esporas controlando el crecimiendo del micelio.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Cultivo	Agente	Dosis p.f. (kg/ha)	Volumen de caldo (L/ha)	Intervalo entre aplicaciones (min)	N.º de aplicaciones (máx)
Manzano	Moteado o roña del manzano, *Venturia inaequalis*	0,2	200 – 1500	7	4
	Oídio del manzano, *Podosphaera leucotricha*				
Peral	Estemfilosis, mancha negra, *Stemphylium vesicarium*	0,2	200 – 1200	7	4
	Moteado o roña del peral, *Venturia pyrina*				
Membrillero	Moteado o roña del peral, *Venturia pyrina*	0,2	200 – 1500	7	4
	Oídio del manzano, *Podosphaera leucotricha*				
Vid	Oídio de la vid, *Erysiphe necator*	0,15 - 0,2	200 - 1200	8	3
	Black rot, podredumbre negra de la vid, *Phyllosticta ampelicida*				
	Enfermedad de Brenner, enrojecimiento parasitario, *Pseudopeziza tracheiphila*				

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Sangría: Izquierda: 10,25 cm, Primera línea: 0 cm
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Fuente: Negrita, Sin Resaltar
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Color de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Izquierda, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: sencillo
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1, Inglés (Estados Unidos)
Con formato: Izquierda, Sin control de líneas viudas ni huérfanas
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Izquierda, Sin control de líneas viudas ni huérfanas
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Español (España)

FMC
An Agricultural Sciences Company

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España
+34 915 530 104
fmcagro.es

	Excoriosis de la vid, *Diaporthe neoviticola*				
Olivo (mesa/verdeo)	Repilo del olivo, *Venturia oleaginea*	0,1 – 0,2	400 - 1000	10	2
Olivo (aceite/almazara)					
Pimiento (invernadero)	Oídio *Oidium neolycopersici*	0,2 - 0,5	400 - 1000	7	4
Tomate y berenjena (invernadero)	Oídio *Oidium neolycopersici*	0,5	400 - 1000	7	3
Fresal (invernadero)	Oídio de la fresa, *Podosphaera aphanis*	0,3	400 - 1000	7	2

MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante técnicas de pulverización. Las dosis expresadas corresponden a la concentración en el caldo para pulverización hidráulica, debiendo adaptarlas al volumen de caldo que se utilice en caso de pulverización hidroneumática (atomización).
Usar un volumen de caldo que garantice una cobertura homogénea de todo el cultivo.

En condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, realizar los tratamientos de acuerdo con el intervalo mínimo entre aplicaciones: 7 días en manzano, membrillero, pimiento, tomate, berenjena y fresa, 8 días en vid y 10 días en olivo.

Aplicar preferiblemente en aplicaciones preventivas cuando se den las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad siguiendo las recomendaciones de aplicación para cada cultivo:

Frutales de pepita:
Aplicar desde la apertura de las yemas (órgano floral) hasta el comienzo de la maduración del fruto mediante pulverización normal con tractor.

Viña o parral:
Aplicar desde el final del desarrollo de las hojas (9 o más hojas desplegadas) hasta el comienzo de la maduración del fruto mediante pulverización normal con tractor. Siendo la aplicación más importante la realizada antes del cierre del racimo.
En pulverizaciones a bajo volumen asegurar un consumo mínimo de 75 gr de ingrediente activo por hectárea (0,15 kg p.f./ha).

Olivar:
Aplicar mediante pulverización normal con tractor.
Aceitunas de verdeo:
La primera aplicación se realizará antes de la floración, la segunda después de floración.
Aceitunas de almazara:
La primera aplicación se realizará tras la floración y la segunda solamente después de la

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Sangría: Izquierda: 10,25 cm, Primera línea: 0 cm
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Izquierda, Interlineado: sencillo
Con formato: Fuente: Negrita, Sin Resaltar
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Español (España)

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España
+34 915 530 104
fmcagro.es

recolección y antes de la floración.

Solanáceas (pimiento, tomate y berenjena):
Uso en invernadero. Aplicar desde el desarrollo de las hojas (2ª hoja verdadera desplegada) hasta la maduración del fruto. Aplicar mediante pulverización manual con lanza.

Fresas:
Uso en invernadero. Aplicar desde el desarrollo de las hojas (2ª hoja verdadera desplegada) hasta la maduración del fruto. Aplicar mediante pulverización manual con lanza.

MANEJO DE RESISTENCIAS

Para prevenir la aparición de resistencias, cada 2 aplicaciones, alternar con otros fungicidas no susceptibles de resistencias cruzadas.
Spa1: Para evitar la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con ningún otro que contenga kresoxim-metil más de 4 aplicaciones por año en frutales de pepita y 3 aplicaciones en el resto de cultivos.

PLAZOS DE SEGURIDAD

Respetar un plazo de seguridad entre la aplicación y la cosecha de:

Manzano, peral y membrillo: 28 días.
Vid: 35 días.
Olivo de verdeo: No procede.
Olivo de almazara: 30 días.
Tomate, berenjena y fresal: 3 días.
Pimiento: 4 días

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.
Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Sangría: Izquierda: 10,25 cm, Primera línea: 0 cm
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Texto 1, Sin Resaltar
Con formato: Color de fuente: Texto 1
Con formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Texto 1, Sin Resaltar
Con formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Texto 1
Con formato: Sin subrayado
Con formato: Fuente: Negrita, Sin Resaltar
Con formato: 00_Body
Con formato: Español (España)

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España
+34 915 530 104
fmcagro.es

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Sangría: Izquierda: 10,25 cm, Primera línea: 0 cm

Con formato: Color de fuente: Automático

An Agricultural Sciences Company

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

Con formato: Español (España)