FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

AUDACE® EC

Insecticida con actividad por contacto e ingestión de amplio espectro en numerosos cultivos

Concentrado emulsionable (EC)

GRUPO	3A	INSECTICIDA

Composición:

Deltametrin 25 g/l (2,5% p/v)

Contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS nº 64742-94-5), Oleilamina etoxilada, sal dodecilbencenosulfónica (CAS: 66467-20-7), Sal cálcica de derivados alquílicos C10-13 del ácido bencenosulfónico (CAS 1335202- 81-7/EC 932-231-6), Isobutanol (CAS 78-83-1).

Contenido neto: 0,25 L – 0,50 L - **1 L** – 5 L - 10 L

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº **ES-00012** por

GOWAN CROP PROTECTION LTD.
Rothamsted Research, West Common, Harpenden
AL5 2JQ Hertfordshire
(REINO UNIDO)

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.
USO RESERVADO PARA AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
No autorizado en lugares destinados al público en general.

Guardar el producto en lugar fresco, seco y bien ventilado
Fecha de fabricación y número de lote: ver marcaje.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: AKR2-X0U9-700A-J4XK



PELIGRO

H226: Líquidos y vapores inflamables
H302: Nocivo en caso de ingestión
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315: Provoca irritación cutánea
H318: Provoca lesiones oculares graves
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas,de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P261: Evitar respirar la niebla o los vapores.
P280: Llevar guantes, gafas y máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P391: Recoger el vertido.
P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede provocar:
Irritación en ojos, piel y mucosas. Neumonitis por aspiración.

Primeros auxilios:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
En caso de ingestión, descontaminación digestiva según estado de consciencia.
Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA., Teléfono 915620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

El aplicador deberá utilizar guantes y protección ocular y/o facial (gafas de protección o pantalla facial según norma UNE-EN 166:2002) durante la mezcla/carga del producto.
-Durante la aplicación manual en cultivos altos se utilizarán guantes de protección y mono tipo 6 (ropa de protección contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009).

-Durante la aplicación con tractor (cultivos altos y bajos) y manual (cultivos bajos) se utilizará guantes de protección. Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
-Durante la limpieza del equipo se utilizará la misma protección que durante la aplicación.
-En invernadero, cuando el cultivo supere el metro de altura, la anchura libre entre líneas deberá ser superior al 1,2 m.
-No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

SPe 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m. hasta la zona no cultivada o de 10 m. usando boquillas de reducción de deriva de >50% en cultivos leñosos y de 5 m. en el resto de cultivos.
SPe 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.
Después de la aplicación las abejas deben permanecer en las colmenas por un periodo de 1 día o estar alejadas de la zona de aplicación al menos 3 km.

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de aguas superficiales de (según se indica en tabla):

Cultivo	Tipo de boquillas		
	Tradicionales	Reductoras deriva +50%	Reductoras de deriva +90%
Frutales	35 m	30 m	15 m
Olivo	30 m	20 m	10 m
Vid	20 m	15 m	5 m
Resto de cultivos	5 m		

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (no limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

GESTION DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador.
Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS

AUDACE® EC es un insecticida de la familia de los piretroides que se presenta como concentrado emulsionable para aplicación foliar y con actividad por contacto e ingestión. Es eficaz sobre numerosos insectos chupadores y masticadores, en estado de larvas o adultos que afectan a las plantas. Actúa sobre la transmisión nerviosa de los insectos y posee además un efecto repelente. AUDACE® EC se caracteriza por su polivalencia en numerosos cultivos.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD:

Cultivo/Especie	Plaga	Dosis	Número máximo de aplicaciones	Intervalo Mínimo (días)	Volumen de caldo (l/ha)	Plazo Seguridad
Alfalfa	Apion del guisante, *Holotrichapion pisi.* Cuca de la alfalfa, *Colaspidema atrum.* Mosquitos verdes, *Empoasca* spp.	0,25 L/ha	2	14	400	14
Algodonero	Heliothis, *Helicoverpa* spp	0,5-0,7 L/ha	2	14	300-350	30
Almendro	Áfidos, pulgones, *Aphididae*. Espumadora, *Neophilaenus campestris.* Espumadora, *Philaenus spumarius*	0,03%	2	14	1400	30
	Lepidópteros	0,05%			1000	
	Minadora de los brotes y frutos, *Anarsia lineatella*	0,05%			1000	
Avellano	Chinches, heterópteros. Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,03%	2	14	1400	30
	Lepidópteros	0,05%			1000	
Apio y perejil (aire libre), **y Rúcula**	Áfidos, pulgones, *Aphididae*. Lepidópteros	0,05%	2	14	700	3
	Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp.	0,3-0,5 L/ha				
Arbustos y pequeños árboles ornamentales (aire libre, invernadero y cultivo protegido)	Áfidos, pulgones, *Aphididae*. Trips	0,05%	3	7	500-1000	NP
	Moscas blancas, *Aleyrodidae*	0,07%			700	
Berenjena (aire libre e invernadero)	Chinche verde, pudenta, *Nezara viridula*	0,03%	3 aire libre 4 invernadero	7	600-1000 al aire libre 600-1400 en invernadero	3
	Chinches, heterópteros; Áfidos, pulgones, *Aphididae.* Lepidópteros	0,05%				

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Cultivo/Especie	Plaga	Dosis	Número máximo de aplicaciones	Intervalo Mínimo (días)	Volumen de caldo (l/ha)	Plazo Seguridad
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07%				
	Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp.	0,3-0,5 L/ha			300-500	
Pimiento (aire libre e invernadero)	Chinche verde, pudenta, *Nezara viridula*	0,03 %	3 aire libre 4 invernadero	7	600-1.000 l/Ha. al aire libre y 600-1.400 l/Ha en invernadero	3
	Chinches, *heterópteros.* Lepidópteros. Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,05 %			600-1000	
	Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp.	0,3-0,5 L/ha	3		300-500 l/Ha	
Cebolla y Ajo	Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp. Trips	0,3-0,5 L/ha	3	14	400-500	7
Cereales (invierno/prima-vera)	Áfidos, pulgones, *Aphididae*. Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp	0,3-0,5 L/ha	1		400-600	30
Cerezo	Mosca de la cereza, *Rhagoletis cerasi*	0,04-0,05%	1		1000-1400	7
Colza	Lepidópteros. Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,03-0,05%	3	14	600	45
Cucurbitáceas (aire libre e invernadero)	Chinches, heterópteros. Áfidos, pulgones, *Aphididae*, Lepidópteros. Mosca de las Calabazas, *Dacus frontalis* (Tefrítidos, T*ephritidae*)	0,05%	3	14	600-1000 al aire libre 600-1400 en invernadero	3
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp	0,3-0,5 L/ha			400-500	
Espárrago	Áfidos, pulgones, *Aphididae*. Criocero del espárrago, *Crioceris asparagi*, *C. duodecimpunctata.* Trips	0,3 - 0,5 l/ha	2	14	600-1000	NP

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Cultivo/Especie	Plaga	Dosis	Número máximo de aplicaciones	Intervalo Mínimo (días)	Volumen de caldo (l/ha)	Plazo Seguridad
Fresal (aire libre e invernadero y cultivo protegido)	Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,05%	3	14	500-1000	3
Frutales de hueso	Mosca de la fruta, *Ceratitis capitata*	0,05%	1		1000-1400	7
	Chinches, heterópteros. Áfidos, pulgones, Aphididae Espumadora, *Neophilaenus campestris.* Espumadora, *Philaenus spumarius*. Lepidópteros	0,03-0,05%				
Frutales de pepita	Lepidópteros	0,035%	2	14	1000-1400	7
	Psila del peral, *Cacopsylla pyri.*	0,05%			1000	
	Áfidos, pulgones, *Aphididae.* Espumadora, *Philaenus spumarius.* Chinches, heterópteros.	0,03-0,05%			1000-1400	
Girasol	Lepidópteros. Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,03-0,05%	1		600	60
Guisantes, para grano	Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,25 L/ha	2	14	1000	7
	Aphis fabae (pulga de las habas)	0,3 L/ha				
	Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp. Lepidópteros, ~~Trips~~	0,3-0,5 L/ha				
	Trips	0,3-0,5 L/ha				
Guisantes, verdes	Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,25 L/ha	2	14	1000	7
	Aphis fabae (pulga de las habas)	0,3 L/ha				
	Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp Lepidópteros	0,3-0,5 L/ha				
	Trips	0,3-0,5 L/ha				

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Cultivo/Especie	Plaga	Dosis	Número máximo de aplicaciones	Intervalo Mínimo (días)	Volumen de caldo (l/ha)	Plazo Seguridad
Hortalizas del género brassica (excepto repollo, col rizada (kale) y col china)	Áfidos, pulgones, Aphididae Lepidópteros	0,05%	2	14	500	7
	Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp	0,3-0,5 L/ha				
Garbanzo, y lentejas para grano	Áfidos, pulgones, *Aphididae*. Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp. Lepidópteros	0,3-0,5 L/ha	2	14	500-1000	7
Garbanzo, Habas, judías y lentejas verdes	Áfidos, pulgones, *Aphididae*. Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis* spp, Lepidópteros	0,3-0,5 L/ha	2	14	500-1000	7
Lima, Limonero y Mandarino (incluido clementino e híbridos),	Espumadora, *Philaenus spumarius*. Psílidos, *Psyllidae* Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,03 %	1		1000	30
Naranjo	Mosca de la fruta, *Ceratitis capitata*. Cochinillas, *Coccidae.* Cochinillas harinosas, *Pseudococcidae*.	0,05 %	1		1000	30
	Espumadora, *Philaenus spumarius*. Psílidos, *Psyllidae* Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,03 - 0,05 %				
Lechuga (aire libre)	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3-0,5 L/ha	3	14	400-500	7
	Áfidos, pulgones, Aphididae, Lepidópteros	0.05%		7	500-1000	
Maíz	Áfidos, pulgones, Aphididae, Lepidópteros	0,3-0,5 L/ha	3	14	600	30
	Gusanos grises,r osquillas, Agrotis spp.	0,5 L/ha				

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Castaño y Nogal	Áfidos, pulgones, *Aphididae*	0,03%	2	14	1400	30
	Lepidópteros	0,05%			1000	

Olivo	Prays, polilla del olivo, Prays oleae	0,03%	1		1000-1400	7
	Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabeoides. Caparreta negra, Saissetia Oleae. Espumadora, Philaenus Spumarius. Mosca del olivo, Bactrocera oleae	0,05%				
	Algodón del olivo, tramilla, Euphyllura olivina	0,03-0,05%				
Ornamentales herbáceas (aire libre e invernadero)	Lepidópteros	0,035%	3	7	500-1000	NP
	Áfidos, pulgones, Aphididae. Espumadora, Philaenus spumarius Trips	0,05%			500-1000 al	
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07%			700	
Patata	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata	0,5 L/ha	3	14	600	7
	Rosquilla negra, Spodoptera littoralis	0,3-0,5 L/ha			400-500	
Puerro	Trips	0,03-0,05%	3	14	400-500	7
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3-0,5 L/ha				
Rábano y Zanahoria	Áfidos, pulgones, Aphididae. Coleópteros. Lepidópteros. Liriomiza, Liriomyza spp.	0,3-0,5 L/ha	3	14	500-1000	7
Remolacha azucarera	Lepidópteros	0,5 L/ha	1		400-600	30
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Áfidos, pulgones, Aphididae				300-500	
Tabaco	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Trips	0,3-0,5 L/ha	3	14	500-1000	7

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Tomate (aire libre e invernadero)	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula	0,03%	3	7 invernadero 14 aire libre	600-1000 aire libre 600-1400 invernadero	3
	Chinches, heterópteros. Áfidos, pulgones, Aphididae. Lepidópteros.	0,05%				
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07%				
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp	0,3-0,5 L/ha			300-500	
Vid	Espumadora, Philaenus Spumarius. Polilla del racimo, Lobesia botrana	1ª generación: 0.05% 2ª y 3ª generación: 0,05-0,07%	3	14	1000	7
	Mosquito verde, Jacobiasca Lybica. Mosquitos verdes, Empoasca spp	0,05 %				

(*NP: No procede establecer ningún plazo de seguridad)

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

MODO DE EMPLEO
Con independencia del volumen de caldo, no superar las dosis máximas de 700 ml/ha de producto formulado en Frutales de hueso, vid y olivo; 250 ml/ha en alfalfa. Para el resto de cultivos, la dosis máxima será 500 ml/ha.
Momento de aplicación: Tratar a la aparición de la plaga, cuando se observen los primeros síntomas.
En olivo para mosca aplicar en consonancia con el número de adultos capturados en trampa. Para *Prays* pulverizar al inicio de la floración (generación antófaga) y justo después de la formación de las primeras aceitunas (generación carpófaga), en el intervalo entre la puesta huevos y su incubación, de acuerdo a los adultos capturados en trampas de feromonas
Las hojas de vid no son aptas para el consumo. La aplicación de AUDACE EC ® reduce la producción de micotoxinas en el maíz como consecuencia del control sobre *Ostrinia* y *Sesamia* (en caso de que exista infestación).
En algodonero aplicar a la aparición de la plaga, en el estadio de crecimiento BBCH 69-79 (fin de la floración hasta que el 90 % de las cápsulas alcanzan el tamaño final).
En espárrago solo se realizarán aplicaciones en campo posteriores a la cosecha.
En rábano y zanahoria aplicar a la aparición de la plaga en el estadio BBCH 15-48 (desde la 5ª hoja desplegada hasta que se alcanza el 80 % del diámetro esperado de la raíz).
En guisante para grano, la dosis contra Aphis fabae (pulga de las habas) es de 0,3 l/ha.

Método de aplicación: Aplicar mediante pulverización foliar llenando el tanque del pulverizador hasta las 2/3 partes con agua, añadiendo la cantidad exacta de AUDACE EC y agitando continuamente hasta su total disolución. Proceda al triple enjuagado del envase y complete el llenado del depósito mientras continúa agitando, incluso durante la aplicación. No preparar más volumen de caldo de pulverización del requerido para el tratamiento inmediato.
Es necesario revisar y ajustar el equipo de aplicación antes de la pulverización con el objeto de adecuarlo a las condiciones del cultivo, eligiendo las boquillas apropiadas para reducir la deriva, si se encuentra cerca de cursos de agua, estanques, canales o acequias.

Deben utilizarse todas las posibles técnicas de control junto con los métodos físicos y biológicos, con el fin de reducir las poblaciones y minimizar el número de aplicaciones necesarias para un control efectivo.
Los piretroides pueden inducir la proliferación de ácaros por lo que se recomienda vigilar los cultivos en que sean frecuentes los ataques de éstos.
Para evitar la aparición de resistencias, utilizar este producto en un programa de tratamientos alternados con otros insecticidas de diferentes modos de acción que no contengan principios activos de la misma familia, realizando como máximo el número de aplicaciones indicadas en esta etiqueta. Vigilar la situación siempre que sea posible con el fin de detectar los primeros signos de resistencia.

PRECAUCIONES
No se han observado síntomas de fitotoxicidad cuando se usa de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, sin embargo en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc).
La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido, el usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.