FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Nutrileaf™ Green

AMINOÁCIDOS
Para aplicación foliar y fertirrigación.
Abono Hidrosoluble

CE

Contenido Declarado:
Aminoácidos libres ..... 7,6 % p/p (8,5% p/v)
Nitrógeno (N) total..... 5,1% p/p (6,0% p/v)
Nitrógeno (N) Orgánico..... 2,5% p/p (2,9% p/v)
Nitrógeno (N) Amoniacal ..... 2,5 % p/p (3,0% p/v)
pH 6,5 - 7,5

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR EL PRODUCTO

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CAAE INSUMOS UNE 142500

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según RCE 2018/848 conforme a la Norma UNE 142500

Fabricado por:

LUQSA – Lérida Unión Química, S. A.
Afueras, s/n
25173 Sudanell - Lleida (España)
Tel.: 973 25 82 56
e-mail: info@luqsa.es
Distribuido por:

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.U.
Pº. de la Castellana, 257 – 5º. 28046 Madrid
Tlf. 915 530 104
www.fmcagro.es

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS

NUTRILEAF GREEN es un nutriente orgánico a base de aminoácidos procedentes de un proceso de fermentación controlada por *C. melassecola,* materia prima de origen vegetal, listo para su uso en aplicación foliar y fertirrigación en los momentos de máxima actividad vegetativa. NUTRILEAF® GREEN permite aportar a la planta la fuente directa para que ésta sintetice las proteínas.

Contiene principalmente Glutámico, Aspargina y Alanina que actúan como fuente de nitrógeno, aumento de la actividad fotosintética, y acción sobre el cuajado, el engorde de los frutos y estimulan el crecimiento vegetal.

APLICACIONES Y DOSIS

Cultivo	**Aplicación foliar**		**Fertirrigación**	
	Momento de aplicación	**Dosis %**	**Momento de aplicación**	**Dosis L/ha**
Hortícolas y ornamentales	Trasplante Primeros estadios	0,3 - 0,5	3-4 tratamientos después del trasplante	15 - 25
Frutales y Cítricos	Brotación Cuajado Engorde de frutos	0,3 - 0,5	Brotación Cuajado Engorde de frutos	18 - 25
Olivo	Prefloración Endurecimiento	0,3 - 0,5	Primavera Otoño	18 - 20
Viña	Brotación Prefloración Cuajado 3 semanas antes de vendimia	1,5 - 2 L/ha	Nuevas plantaciones	3 - 4
Cereal	Junto con fitosanitarios	1,5 - 2 L/ha	-	-
Remolacha y patata	Junto con fitosanitarios	0,3	3 tratamientos durante todo el ciclo	20
Fresón	Varias aplicaciones comenzando una semana después del trasplante En momentos de estrés	0,25-0,5	Una aplicación semanal, en trasplante, floración y engorde del fruto	1L cada 10.000 plantas
Algodón	Primeros estadios Inicio floración	0,3 - 0,5	Primeros estadios y floración	15 – 20
Platanera			Octubre-noviembre a marzo-abril aspersión 2-3 cc planta /semana	90 - 120 Dosis Total

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

OBSERVACIONES
No mezclar con aceites, azufres ni cobres. Antes de realizar cualquier mezcla con el producto debe consultarse al Servicio Técnico de la empresa o al de su Distribuidor.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, sin embargo en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Empresa garantiza la composición, formulación y contenido, el usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Aminograma:

Ácido aspártico..... 0,12% p/p
Ácido glutámico..... 3,71% p/p
Serina..... 0,0064% p/p
Glicina..... 0,0064% p/p
Treonina..... 0,0064% p/p
Alanina..... 0,32% p/p
Valina..... 0,012% p/p
Metionina..... 0,012% p/p
IsoLeucina..... 0,0064% p/p
Leucina..... 0,012% p/p
Fenilalanina..... 0,0064% p/p
Lisina..... 3,45% p/p

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
-

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono 915 620 420.
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Proceso de obtención: Fermentación por medio de *Corynebacterium Melsseecola*, pasteurización y separación.
Principales materias primas de origen orgánico: Melazas y jarabes de carbohidratos de origen vegetal.

Metales pesados: Clase A. - Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Mantener a una temperatura entre 5 y 35 ºC. Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener únicamente en los envases originales, cerrados herméticamente. Almacenar alejado de calor, radiación y electricidad estática.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.