FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Nutrileaf™ Zn-Mn

Mezcla líquida de micronutrientes minerales Zinc (Zn) y Manganeso (Mn)

Aniones minerales: carbonato, óxido
Para aplicación foliar y fertirrigación. Abono hidrosoluble
Suspensión concentrada (SC)

Contenido:
Zinc (Zn) soluble en agua……19,7% p/p (34,87% p/v)
Manganeso (Mn) soluble en agua……14,0 % p/p (24,78% p/v)

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad.
***No sobrepasar las dosis adecuadas*.**

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido: 5 L (8,9 kg)

Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

CAAE INSUMOS UNE 142500

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R (UE) 2018/848 conforme a la Norma UNE 142500

FMC y el logo de FMC son marcas registradas de FMC Corporation y/o sus filiales. FMC Corporation. Todos los derechos reservados

Importado en UE por FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Dinamarca. TEL:: 45 (0) 96909690

Fabricado por:
FMC Agro Limited,
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH
Reino Unido.
Tel: +44 1244537370,www.fmc-agro.co.uk.

Distribuido por:
FMC Agricultural Solutions S.A.U.,
Paseo de la Castellana, 257, 5º planta
28046 Madrid-ESPAÑA.
Tel: +34 915 53 01 04, www.fmcagro.es

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS

El abono **Nutrileaf™ Zn-Mn** es una suspensión concentrada destinada para aplicación foliar en hortalizas y frutales para prevenir y corregir las carencias de manganeso y zinc. Puede aplicarse en numerosos cultivos; su formulación lo hace especialmente adecuado para cítricos. Su aplicación evita anomalías en el crecimiento, pérdidas de rendimiento y calidad de cosecha.

Manganeso actúa directamente sobre la fotosíntesis, aumenta la formación de raíces laterales, influye en la reserva energética, activa el crecimiento de la planta al influir sobre el crecimiento celular. También incrementa el valor de la concentración de componentes determinantes como el ácido cítrico y la vitamina C. El Zinc está implicado en la producción de ciertas hormonas (en particular, auxinas), en la asimilación de dióxido de carbono para la fotosíntesis, en la síntesis de proteínas y en la producción de ARN.

DOSIS Y CONDICIONES DE USO

Aplicaciones Foliares

Cítricos: Utilizar 100-150 cc/hl en las brotaciones de primavera, repetir en verano.

Frutales de pepita (Manzanas, Peras, etc.): Aplicar 100-150 cc/hl sobre las hojas jóvenes después del cuajado. Repetir la aplicación 2-3 veces en verano si se considera necesario.

Frutales de hueso (Melocotón, Nectarina, Cerezas, Albaricoquero, etc.): Hacer una primera aplicación a la dosis de 100-150 cc/hl después de la floración. Repetir el tratamiento 2-3 veces si fuera necesario durante el periodo de crecimiento activo.

Olivo: Aplicar 100-150 cc/hl en primavera en los brotes. Repetir el tratamiento si fuera necesario.

Cultivos hortícolas y Fresa: Aplicar 100-150 cc/hl al principio de temporada antes de floración. Realizar el número de tratamientos necesarios a intervalos de 15-20 días.

Cultivos industriales (Girasol, Algodón, etc.): Aplicar 100-150 cc/hl antes de floración. Repetir el tratamiento si fuera necesario después de la formación de los frutos.

Viña: Aplicar 100-150 cc/hl al comienzo de la brotación.

Cereales (Trigo, Cebada, Arroz, Maíz, etc.): Aplicar 100-150 cc/hl en las plantas jóvenes. Repetir el tratamiento en el estado de ahijamiento y elongación de tallos. Se podrán realizar 1-2 aplicaciones después de la formación de la espiga durante el periodo de crecimiento de los granos.

Utilizar sólo cuando exista una necesidad reconocida. No superar las dosis adecuadas.
Se recomienda utilizar los resultados de los análisis del suelo y de los tejidos siempre que sea posible para orientar las aplicaciones de micro y macronutrientes con el fin de optimizar el estado de los nutrientes en los cultivos.

No aplicar este producto con luz solar muy intensa o con temperaturas superiores a 25ºC. Si es posible, pulverizar al atardecer o a primera hora de la mañana para obtener mejores resultados.

Utilizar sólo cuando exista una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis adecuadas.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Se recomienda a los agricultores que eviten las pérdidas de nutrientes y que tengan en cuenta las recomendaciones oficiales a la hora de elaborar planes de fertilización.

FERTIRRIGACIÓN

Cítricos, Frutal de hueso y pepita: Aplicar una dosis general de 10-20 L/ha al principio de la temporada. Repetir la aplicación 2-3 veces si fuera necesario.
Hortícolas y fresa: 3-4 l/ha y aplicación. Se recomienda al menos 2-3 aplicaciones por ciclo.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar bien el envase antes de abrirlo y aplicarlo.
El equipo de pulverización debe estar limpio. Llene el tanque de pulverización con agua hasta la mitad, comience a agitar y añadir la cantidad necesaria de abono **Nutrileaf™ Zn-Mn.** Aclarar el recipiente a fondo, añada el enjuagado al depósito de pulverización, complete el llenado y aplíquelo sin demora. Mantener agitación durante todo el proceso. Limpiar bien el pulverizador después del uso.

COMPATIBILIDAD

El abono **Nutrileaf™ Zn-Mn** es física y químicamente compatible con una amplia gama de productos agroquímicos. Consulte al Servicio Técnico de la empresa o a su distribuidor para obtener la información más reciente. Lea siempre atentamente la etiqueta del producto asociado antes de mezclarlo con el abono **Nutrileaf™ Zn-Mn.** Tome precauciones con las mezclas de productos con reacción ácida.

Póngase en contacto con la empresa o el distribuidor de la empresa para obtener recomendaciones más específicas (www.fmcagro.es)



H410. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102. Manténgase fuera del alcance de los niños.
P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P273. Evitar su liberación al medio ambiente.
P391. Recoger el vertido.
P501. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
Contiene 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica

ATENCIÓN

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Proteger de las heladas. Almacenar a una temperatura superior a 5°C

Conservar en un almacén adecuado, fresco y bien ventilado.
No almacenar a la luz directa del sol o cerca de fuentes directas de calor.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
No reutilizar el envase.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. El usuario está obligado a entregar este envase o residuos de envases a través de los canales establecidos por el SCRAP SIGFITO.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.