PERFIL® EVO

Acaricida Específico
Suspensión Concentrada (SC)

GRUPO	10A	INSECTICIDA

Composición:
Hexitiazox ……. 25,87% p/v (24% p/p)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el número ES-00235

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

CONSERVACIÓN: GUARDAR EL PRODUCTO EN LUGAR SECO, FRESCO Y VENTILADO

AGÍTESE ANNTES DE USAR

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

TITULAR:

QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.
C/ Valle del Roncal 12, 1ª Planta, Oficina 7,
28232 LAS ROZAS, Madrid, España
Tel. +34 91 626 60 97

DISTRIBUIDO POR:
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.U.
P°. de la Castellana, 257 — 5º. 28046, Madrid
Tel. 915 530 104 - www.fmcagro.es

FMC, el logo de FMC y PERFIL son marcas registradas de FMC Corporation y/o sus filiales. FMC Corporation. Todos los derechos reservados.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: S6N0-U0H2-T00G-8GQG



H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P931: Recoger el vertido.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
Contiene 1,2-benzisothiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

RECOMENDACIÓN PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la mezcla/carga y aplicación y ropa de trabajo adecuada, es decir mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Se establece un plazo de reentrada de:

- 7 días para cítricos.
- 10 días para ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales.
- 12 días para frutales de pepita, cerezo, ciruelo, endrino, albaricoquero, almendro, castaño, avellano, pistacho, nogal, pino piñonero y caqui.
- 14 días para vid.

Medidas adicionales de mitigación para el operador:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de:

- 25 m hasta las masas de aguas de agua superficial para el uso propuesto en cítricos y frutales de pepita, cerezo, ciruelo, endrino, albaricoquero, almendro, castaño, avellano, pistacho, nogal, pino piñonero y caqui.
- 10 m hasta las masas de aguas de agua superficial para el uso propuesto en vid.
- 5 m hasta las masas de aguas de agua superficial para el uso propuesto en ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales.

Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad 5 m hasta la zona no cultivada.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.
El envase no puede ser reutilizado.

CARACTERÍSTICAS

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

PERFIL EVO es un potente acaricida no sistémico que actúa por contacto e ingestión produciendo la parálisis y la muerte de los ácaros afectados.
Inhibe la síntesis de la quitina en todos los estadios del ciclo biológico (huevo, larva, ninfa) y actúa como esterilizante de hembras adultas. No controla individuos adultos.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

CULTIVOS	AGENTE	DOSIS (mL/Hl)	Nº APLIC	Volumen de caldo L/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Arbustos y pequeños árboles ornamentales (Uso exclusivo para especies florales)	Ácaros tetraníquidos, *Tetranychidae*	20	1	500 – 1000	Aplicar únicamente al aire libre al principio de la infestación.
Cítricos	Ácaros tetraníquidos, *Tetranychidae* Ácaro rojo de los cítricos, *Panonychus citri*	4-6	1	1000 – 2500	Aplicar al principio de la infestación.
Frutales de pepita	Ácaros tetraníquidos, *Tetranychidae*	20	1	800 – 1000	Aplicar al principio de la infestación.
Ornamentales herbáceas (Uso exclusivo para especies florales)	Ácaros tetraníquidos, *Tetranychidae*	20	1	500 – 1000	Aplicar únicamente al aire libre al principio de la infestación.
Vid	Ácaros tetraníquidos, *Tetranychidae*	20	1	500 – 1000	Aplicar al principio de la infestación.

Usos menores*

USO MENOR	AGENTE	DOSIS (ml/Hl)	Nº APLIC.s	VOL. CALDO (L/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Albaricoquero, Almendro, Avellano, Caqui, Castaño, Cerezo, Ciruelo, Endrino (únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales), Nogal	Ácaros tetraníquidos, *Tetranychidae*	20	1	800 – 1000	Máximo 0,2 L/ha. Aplicar antes del principio de fin de la floración sin presencia del fruto formado.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

USO MENOR	AGENTE	DOSIS (ml/Hl)	Nº APLIC.s	VOL. CALDO (L/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Pinos (Exclusivamente para pino piñonero)					
Pistachero					

* Con respecto a los usos menores autorizados la responsabilidad en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor recaerá sobre la persona que utilice el producto fitosanitario tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del Reglamento (CE) 1107/2009.

PLAZO DE SEGURIDAD

CULTIVO	PLAZO DE SEGURIDAD (Días)
Cítricos	14
Frutales de pepita	28
Vid	21
Arbustos y pequeños árboles ornamentals, Ornamentales herbáceas	NP
Usos menores: Albaricoquero, Almendro, Avellano, Caqui, Castaño, Cerezo, Ciruelo, Endrino, Nogal, pino piñonero, Pistacho	NP

CONDICIONES GENERALES DE USO
Aplicar en pulverización foliar.

MANEJO DE RESISTENCIAS
Para evitar problemas de resistencia, alternar con acaricidas con diferente modo de acción y distinta familia química.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.