FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

SANAGRICOLA® BLUE WG

Fungicida y bactericida preventivo en forma de gránulos dispersables en agua (WG)

Composición:
Oxicloruro de cobre (expresado en cobre): 50% p/p (500 g/kg)
Contiene diisopropilnaftalensulfonato sódico (CAS 1322-93-6)

Contenido neto: ≤ 10 kg (bolsa/saco plástico); ≤ 10 kg (bolsa/saco plástico metalizado); ≤ 25 kg (sacos papel)

Lote y fecha de fabricación: Véase envase

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Antes de utilizar el producto léase detenidamente esta etiqueta

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

UFI: TDF6-3A8D-6A04-XP4R

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 22.209

Titular de la Inscripción y Fabricante:
Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV)
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Vallès
Barcelona
tel. 93 579 66 77
fax 93 579 17 22
e-mail: iqv@iqvagro.com

Distribuido por:
FMC Agricultural Solutions S.A.U.
Paseo de la Castellana 257, 5º
28046, Madrid (España)

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es



Atención

H302+H332: Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261: Evitar respirar la niebla de pulverización.
P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280: Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
P304+P340: EN CASO de INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P391: Recoger el vertido.
P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Manifestaciones clínicas en caso de exposición y/o contacto:

- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- Náuseas, vómitos, sabor metálico, dolor epigástrico, hematemesis y melenas.
- Alteraciones hepatorrenales y en el SNC.
- Metahemoglobinemia, hemólisis, colapso circulatorio y Shock.
- Hipersensibilidad y decoloración verdosa de pelo, dientes, piel y córnea.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
- En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia.
  - En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.
  - Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA.
  - Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta

Mitigación de riesgos en la manipulación

Aplicador:

- Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
- No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Tipo de aplicación	Equipo de aplicación	Equipo de protección*		
		Mezcla / carga del equipo	Aplicación	Limpieza y mantenimiento del equipo
Aire libre	Pulverización con tractor	R, G	R	R, G
	Pulverización manual con lanza / pistola o mochila	R, G	R, G	R, G
Invernadero	Pulverización manual con lanza / pistola o mochila	R, G, P1	R34c, G, C, PF	
	Pulverización manual con carretilla	R, G		

* Descripción de los equipos de protección:
  - R: Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
  - R34c: Ropa de protección química 3 ó 4 (según norma UNE-EN14605:2005+A1:2009) y calzado resistente a productos químicos.
  - G: Guantes de protección química
  - P1: Mascarilla tipo FFP1 (según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro tipo P1 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006).
  - C: Capucha.
  - PF: Pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).

Trabajador:

- No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco.
- Ropa de trabajo (manga larga, pantalón largo y calzado adecuado) y guantes de protección química durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada. Se respetará además el plazo de reentrada fijado.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Plazo de reentrada (para todas las tareas excepto inspección y riego):
21 días en frutales de hueso, frutales de pepita, almendro, nogal, avellano y pistachero.
13 días en olivo contra repilo.
11 días en limonero, mandarino, naranjo, toronja y pomelo.
5 días en arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera (todos ellos en invernadero) cuando la aplicación del producto sea con carretilla.

Mitigación de riesgos medioambientales:

SPe 2: Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar en suelos arenosos, pedregosos o con drenaje artificial.

SPe 3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 10 m con cubierta vegetal en limonero, mandarino, naranjo, toronja, pomelo y olivo.
- 20 m con cubierta vegetal en frutales de hueso y de pepita, almendro, nogal, avellano, pistachero, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera (al aire libre).
- 5 m en tomate, berenjena, pimiento, alcachofa, brécol, coliflor, ajo, cebolla, chalote, lechuga y similares, patata, judía verde, guisante verde, lenteja verde, pepino, calabacín, pepinillo, melón, calabaza, sandía y fresal (todos ellos al aire libre, fresal incluidos los túneles)

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

CARACTERISTICAS

SANAGRICOLA BLUE WG es un fungicida y bactericida de contacto con acción preventiva, recomendado en el control de oomicosis (mildius), repilo y otras enfermedades causadas por hongos endoparásitos y bacterias.

USOS AUTORIZADOS Y CONDICIONES DE USO

Tratamientos fungicidas y bactericidas en cultivos y plantaciones agrícolas de:

Cultivo Enfermedad	Condiciones de uso
Limonero, Mandarino, Naranjo, Toronja y Pomelo *Phytophthora spp.* *Bacteriosis*	Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que se hacen visibles varias hojas pero sin alcanzar su tamaño final hasta que el fruto está maduro y óptimo para el consumo (BBCH 15-89). Dosis por aplicación: 0,1-0,2% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 1000-2000 l/ha
Frutales de hueso *Abolladura o lepra (Taphrina spp.), Monilia (Monilinia spp.), Cribado o perdigonado (Wilsonomyces carpophilus), Bacteriosis*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar en prefloración, desde BBCH 95 (50% de las hojas descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles). **Abolladura o lepra**: Dosis por aplicación: 0,15-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha **Monilia, Cribado o perdigonado, Bacteriosis**: Dosis por aplicación: 0,3-0,5% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-665 l/ha
Frutales de pepita *Moteado o roña del manzano (Venturia inaequalis), Moteado o roña del peral (Venturia pyrina), Bacteriosis, Monilia (Monilinia spp.)*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar en prefloración, desde BBCH 91 (los brotes han completado su desarrollo; yema terminal, desarrollada; follaje, completamente verde todavía) hasta BBCH 53 (Apertura de las yemas: las puntas verdes de las hojas, que aún encierran las flores, visibles). **Moteado o roña del manzano, Moteado o roña del peral**: Dosis por aplicación: 0,15-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha **Monilia, Bacteriosis**: Dosis por aplicación: 0,3-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-665 l/ha
Almendro *Abolladura o lepra del melocotonero (Taphrina deformans), Monilia (Monilinia spp.), Cribado o perdigonado (Wilsonomyces carpophilus), Bacteriosis*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar en prefloración, desde BBCH 95 (50% de las hojas descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles). **Abolladura o lepra del melocotonero**: Dosis por aplicación: 0,15-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha **Monilia, Cribado o perdigonado, Bacteriosis**: Dosis por aplicación: 0,3-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-665 l/ha
Avellano y Nogal *Bacteriosis*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar en prefloración, desde BBCH 95 (50% de las hojas descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles). Dosis por aplicación: 0,3-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-665 l/ha

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Pistachero *Alternaria spp., Bacteriosis*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar en prefloración, desde BBCH 95 (50% de las hojas descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles). Dosis por aplicación: 0,3-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-665 l/ha
Olivo *Repilo del olivo (Venturia oleaginea), Tuberculosis del olivo (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi)*	Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 18 días. Aplicar desde que las primeras hojas se separan del brote hasta que aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 10-85). **Repilo del olivo**: Dosis por aplicación: 0,15-0,33% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 600-1000 l/ha **Tuberculosis del olivo**: Dosis por aplicación: 0,33% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 600 l/ha
Tomate **(aire libre e invernadero)** *Mildiu de la patata y el tomate (Phytophthora infestans), Alternaria de las solanáceas (Alternaria solani), Antracnosis del tomate (Colletotrichum coccodes), Bacteriosis*	Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 5º hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89). **Aire libre:** **Mildiu de la patata y el tomate**: Dosis por aplicación: 0,15-0,40% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha **Alternaria de las solanáceas, Antracnosis del tomate, Bacteriosis**: Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-665 l/ha **Invernadero (lanza/pistola o mochila):** **Mildiu de la patata y el tomate**: Dosis por aplicación: 0,15-0,40% (1,5-1,7 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha **Alternaria de las solanáceas, Antracnosis del tomate, Bacteriosis**: Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-1,7 kg/ha); Vol. de caldo: 400-565 l/ha **Invernadero (carretilla):** **Mildiu de la patata y el tomate**: Dosis por aplicación: 0,15-0,40% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha **Alternaria de las solanáceas, Antracnosis del tomate, Bacteriosis**: Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-665 l/ha
Berenjena **(aire libre e invernadero)** *Mildiu de la patata y el tomate (Phytophthora infestans), Alternaria de las solanáceas (Alternaria solani), Antracnosis del tomate (Colletotrichum coccodes), Bacteriosis*	Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89). **Aire libre:** Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-665 l/ha **Invernadero (lanza/pistola o mochila):** Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-1,7 kg/ha); Vol. de caldo: 400-565 l/ha **Invernadero (carretilla):** Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-665 l/ha
Pimiento **(aire libre e invernadero)** *Antracnosis del tomate (Colletotrichum coccodes)*	Máximo 3 aplicaciones por campaña. Aplicar desde que la 5º hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89). Comenzar las aplicaciones a los primeros síntomas de la enfermedad con repeticiones cada 7-10 días dependiendo de la infestación. Dosis por aplicación: 0,24% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 625-665 l/ha
Patata *Mildiu de la patata y el tomate (Phytophthora infestans), Alternaria de las*	Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 5ªhoja verdadera del tallo principal está desplegada (> 4 cm) hasta bayas de la fructificación de 1er grado, de color ocre o amarronadas (BBCH 15-85). **Mildiu de la patata y el tomate**: Dosis por aplicación: 0,15-0,50% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha **Alternaria de las solanáceas**: Dosis por aplicación: 0,30-0,50% (1,5-2 kg/ha); Vol. de

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

solanáceas (Alternaria solani)	caldo: 400-665 l/ha
Pepino, Calabacín y Pepinillo **(aire libre e invernadero)** *Mildiu de las cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis), Tizón de las hojas de las cucurbitáceas (Alternaria cucumerina), Antracnosis o niebla del melón (Colletotrichum orbiculae), Bacteriosis*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta la madurez completa (BBCH 10-89). Dosis por aplicación: 0,30% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 500-533 l/ha
Melón, Sandía y Calabaza **(aire libre e invernadero)** *Mildiu de las cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis), Tizón de las hojas de las cucurbitáceas (Alternaria cucumerina), Antracnosis o niebla del melón (Colletotrichum orbiculae), Bacteriosis*	Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta la madurez completa (BBCH 10-89). **Aire libre:** Dosis por aplicación: 0,30% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-665 l/ha **Invernadero (lanza/pistola o mochila):** Dosis por aplicación: 0,30% (1,5-1,7 kg/ha); Vol. de caldo: 500-565 l/ha **Invernadero (carretilla):** Dosis por aplicación: 0,30% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 500-665 l/ha
Cebolla, Ajo y Chalote *Mildiu de la cebolla (Peronospora destructor), Alternaria spp., Colletotrichum spp., Bacteriosis*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 4ª hoja está claramente visible hasta la inclinación del follaje: en 10% de las plantas, hojas inclinadas (BBCH 14-47). **Mildiu de la cebolla**: Dosis por aplicación: 0,15-0,50% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha ***Alternaria spp.*, *Colletotrichum spp.*, Bacteriosis**: Dosis por aplicación: 0,30-0,50% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-533 l/ha
Lechuga y similares **(aire libre e invernadero)** *Mildiu de la lechuga (Bremia lactucae), Alternaria spp., Antracnosis (Microdochium panattonianum), Bacteriosis*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 2º hoja verdadera está desplegada hasta que se alcanza el tamaño, forma y firmeza de la cabeza típicos (BBCH 12-49). Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-533 l/ha
Brécol y Coliflor *Mildiu de las crucíferas (Hyaloperonospora*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 4º hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta primeros pétalos florales visibles, flores cerradas todavía (BBCH 14-59).

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

parasítica), Mancha negra o tizón de las crucíferas (Alternaria brassicae), Colletotrichum spp. Bacteriosis	**Mildiu de las crucíferas, Mancha negra o tizón de las crucíferas**: Dosis por aplicación: 0,15-0,40% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha ***Colletotrichum spp.*, Bacteriosis**: Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-533 l/ha
Alcachofa *Mildiu de la lechuga (Bremia lactucae), Ascoquitosis de la alcachofa (Boeremia exigua var. exigua), Alternaria spp., Bacteriosis*	Máximo 5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera está desplegada hasta que la inflorescencia principal es visible (BBCH 14-51). **Mildiu de la lechuga**: Dosis por aplicación: 0,20-0,40% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-800 l/ha **Ascoquitosis de la alcachofa**: Dosis por aplicación: 0,15-0,40% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha ***Alternaria spp.*, Bacteriosis**: Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-533 l/ha
Judía verde, Guisante verde y Lenteja verde *Mildiu de la judía (Phytophthora phaseoli), Mildiu del guisante (Peronospora viciae), Antracnosis del haba (Colletotrichum lindemuthianum), Bacteriosis*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada o el 4º zarcillo desarrollado (en variedades sin hojas) hasta la madurez completa (BBCH 14-89). Dosis por aplicación: 0,30-0,40% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-533 l/ha
Fresal **(aire libre e invernadero)** *Antracnosis del fresón (Colletotrichum acutatum)*	Máximo 4 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta que los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico (BBCH 13-85). Dosis por aplicación: 0,20-0,40% (1,5-1,6 kg/ha); Vol. de caldo: 400-800 l/ha
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Palmáceas y Palmera datilera **(aire libre e invernadero)** *Royas (Pucciniaceae)*	Exclusivamente para usos ornamentales. Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar en todos los estadios del cultivo. **Aire libre:** Dosis por aplicación: 0,3-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-665 l/ha **Invernadero (lanza/pistola o mochila):** Dosis por aplicación: 0,3-0,4% (1,5-1,7 kg/ha); Vol. de caldo: 400-565 l/ha **Invernadero (carretilla):** Dosis por aplicación: 0,3-0,4% (1,5-2 kg/ha); Vol. de caldo: 400-665 l/ha

Para todos los usos autorizados:
- no superar la dosis máxima de 8 kg producto/ha y año.
- no superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año.

PLAZO DE SEGURIDAD ENTRE EL ÚLTIMO TRATAMIENTO Y LA RECOLECCIÓN

Berenjena y Tomate: 10 días (aire libre) y 3 días (invernadero)
Limonero, Mandarino, Naranjo, Toronja, Pomelo, Brécol, Coliflor, Olivo, Patata y Pimiento: 14 días
Ajo, Cebolla y Chalote, Pepino, Pepinillo, Calabacín, Judía verde, Guisante verde y Lenteja verde: 3 días
Alcachofa, Melón, Sandía, Calabaza, Fresal, Lechuga y similares: 7 días

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Frutales de hueso, Frutales de pepita, Almendro, Avellano, Nogal, Pistachero, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Palmáceas y Palmera datilera: No procede

MODO DE EMPLEO

En cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización foliar normal con tractor o manual. En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual con lanza/pistola o mochila y con carretilla.

Aplicar el producto preventivamente adaptándolo a la evolución de la enfermedad, al tipo de cultivo y las condiciones climáticas, siguiendo las recomendaciones de los boletines regionales de sanidad vegetal.

Aplicar un volumen de pulverización suficiente para cubrir completamente todas las partes de la planta susceptibles de infección. El volumen necesario dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y del estado de desarrollo del follaje.

PREPARACIÓN DEL CALDO

Llenar el tanque con agua hasta la mitad y verter la cantidad necesaria de producto, manteniendo el agitador en marcha hasta completar con el resto de agua necesaria.
Se recomienda preparar la cantidad de caldo a utilizar, evitando guardar el sobrante para aplicaciones posteriores.

PRECAUCIONES

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros cultivos.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que les facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.