**FMC Agricultural Solutions S.A.U**
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

# SeaMac®PCT

**ABONO CON EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO. "Abono hidrosoluble" para aplicación foliar.**

Extracto de algas naturales de *Ascophyllum nodosum*..... 15% p/v (150 g/L)

**Contenido Declarado:**
Acido Algínico .....1,5 % p/p (1,62% p/v)
Manitol .....0,5 % p/p (0,54% p/v)
pH: 8,5
Conductividad eléctrica (a 25ºC): 58,3 mS/cm ó 54,4 mS/cm

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO**

AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
FMC Agro Limited, Rectors Lane, Pentre, Flintshire CH5 2DH. Reino Unido.
Tel: +44 1244 537370, www.fmc-agro.co.uk

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.U.
Pº. de la Castellana, 257 – 5º. 28046 Madrid
Tlf. 915 530 104
Distribuido por:
www.fmcagro.es



Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC
An Agricultural Sciences Company

**FMC Agricultural Solutions S.A.U**
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Seamac® PCT es una solución que contiene en su formulación 150 g/L de extracto de algas naturales 100% *Ascophyllum nodosum*. Seamac PCT aumenta la absorción de nutrientes, la asimilación del nitrógeno y la producción de hidratos de carbono, consiguiendo un mejor desarrollo de la planta y un mayor rendimiento y calidad de la cosecha. También está indicado para la recuperación de los cultivos que hayan sido sometidos a circunstancias adversas (heladas, sequias etc..)

## CULTIVOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar respetando las siguientes recomendaciones de uso:

| CULTIVO | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|---|---|---|
| Cereales | 1,25 L/ha | En otoño, aplicar al inicio de ahijado |
| | 2,5 L/ha | En primavera, aplicar al inicio del encañado |
| Semillas oleaginosas | 2,5 L/ha | En el otoño aplicar cuando la planta tiene hojas verdaderas |
| | 3 L/ ha | En primavera |
| Remolacha azucarera | 3 L/ha | Aplicar cuando el cultivo tiene 6 hojas totalmente expandidas |
| Patatas | 3 L/ha | Se puede aplicar hasta que los tubérculos tienen 15-20 cm |
| Leguminosas | 3 L/ha | Aplicar inmediatamente antes de la floración |
| Cebolla, Ajo, Puerro y Nabos | 2 L/ha | Realizar 3 tratamientos: 1º 2-3 semanas después de la emergencia. Los siguientes, con intervalos de 14 días |
| Col, Coliflor, Brócoli, Alcachofa y Lechuga | 2 L/ha | Aplicar desde que la planta tiene 4-6 hojas verdaderas hasta la formación del cogollo, con intervalos de 14 días |
| Tomate, Pimiento y Berenjena | 2 L/ha | Realizar 4 tratamientos: el primero después del trasplante y los siguientes a intervalos de 14 días |
| Fresa y Fresón | 2 L/ha | Realizar tres tratamientos: 1º al inicio de brotación; 2º antes de floración y 3º con los primeros frutos cuajados |
| Endibia, Espinaca y Zanahoria | 2 L/ha | Realizar 3 tratamientos: el primero con 3-4 hojas verdaderas y los restantes con un intervalo de 15 días |
| Cucurbitáceas | 2 L/ha | Realizar el primer tratamiento con 3-4 hojas y repetir a intervalos de 14 días |
| Espárrago | 2 L/ha | Aplicar desde el comienzo hasta el final del desarrollo foliar |
| Olivo | 0,2-0,3% | Realizar 2-3 tratamientos, entre el inicio de brotación y floración |
| Cítricos | 2 L/ha | Realizar 3 tratamientos: 1º al inicio de floración, 2º en caída de pétalos y 3º en el cuajado de frutos |
| Frutales de Hueso | 2 L/ha | Realizar 3 tratamientos: 1º principio de floración, 2º caída de pétalos y 3º cuajado |
| Frutales de Pepita | 2 L/ha | Realizar 3-4 tratamientos: 1º Desborre; 2º Botón rosa y los restantes en floración y caída de pétalos |
| Vid | 2 L/ha | Realizar 3 tratamientos: 1º Estadio de 5-6 hojas. 2º Antes de floración. 3º Engorde |
| Platanera | 2 L/fanega | Realizar 3 tratamientos desde la salida del invierno |
| Césped | 4-6 L/ha | En invierno y después de cada corte |
| Alfalfa | 3 L/ha | Aplicar después de cada corte |
| Semilleros | 20 cc/10 L | Aplicar una vez arraigadas las plantas |
| Viveros/Floricultura | 1% | Aplicar en fertirrigación cada 4 semanas |



Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Fertirrigación: Aplicar de 6-8 L/ha, según desarrollo del cultivo, repitiendo cada 10-14 días si fuera necesario.

• Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.
• Evitar respirar los vapores o la nube de pulverización.
P102.Mantener fuera del alcance de los niños.
P270.No comer, beber ni fumar durante su utilización.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

SP1.NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**
Proteger de las heladas. Almacenar a una temperatura superior a 5°C.
Guardar en un lugar fresco, bien ventilado. Mantener el envase herméticamente cerrado.
Mantener alejado de la luz solar directa.

**ADVERTENCIA**
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

**GESTIÓN DE ENVASES**

Enjuague enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión (SIGFITO).



Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.