FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UnicQUEL ™

Abono

Abono Mineral a base de Hierro – Micronutriente quelado por EDDHA

CFP 1(C)(II)(a) Abono inorgánico simple a base de micronutrientes
Contenido declarado:
Hierro (Fe) Soluble en agua …….. Min 6,0 % p/p
Hierro (Fe) quelado por [o,o] EDDHA …. .. Min 5,0 % p/p
Intervalo de pH en que se garantiza la estabilidad de la fracción quelada …. 3 a 11

Ingredientes: Ácido acético, oxo-, sal de sodio, productos de reacción con etilendiamina y fenol, sales sódicas de hierro (CAS Nº 84539-55-9)
Todas las sustancias pertenecen a la CMC1. Sustancias y mezclas de materias vírgenes
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad
No debe sobrepasarse las dosis de aplicación.

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Uso profesional

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según RCE 834/2007 conforme a la Norma UNE 142500

Fecha de fabricación y nº. de lote: véase marcado impreso

Contenido: 5 kg

FMC, el logo de FMC y UnicQUEL son marcas de FMC Corporation y/o sus filiales. FMC Corporation. Todos los derechos reservados.
Fabricado y distribuido por:
FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.U.
Pº. de la Castellana, 257 – 5º. 28046 Madrid
Tlf. 915 530 104
www.fmcagro.es

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No comer, beber ni fumar durante su utilización.

CARACTERÍSTICAS

Excelente formulación en microgránulos altamente solubles, obtenida por un exclusivo proceso de fabricación.
Corrector de clorosis férrica a base de Fe EDDHA, molécula que tiene gran afinidad por el hierro y capacidad para movilizarlo, transportarlo y ponerlo a disposición de las plantas.
De todos los isómeros posibles, la forma orto-orto sería la más estable, manteniendo esta estabilidad en condiciones desfavorables, pH elevados, exceso de metales pesados etc, por lo tanto, la que da persistencia al producto.

UnicQUEL® tiene un alto contenido de hierro quelatado en posición orto-orto (5%). Su actuación en el suelo presenta las siguientes propiedades:

1. Buena estabilidad:
El comportamiento de UnicQUEL™ es independiente del tipo de suelo y su pH. Actúa también en suelos muy alcalinos.

2. Acción rápida:
La fácil absorción de UnicQUEL™ por las raíces, supone una rápida recuperación del cultivo.

3. Alta eficacia:
La alta calidad de la molécula proporciona una total recuperación de las plantas afectadas por clorosis férrica.

4. Acción persistente:
Aplicado a dosis apropiadas los resultados se mantienen durante toda la campaña.

MODO DE APLICACIÓN

Se puede utilizar con todos los sistemas de aplicación (hoyos alrededor del árbol, inyección al suelo mediante reja o lanza inyectora, o debido a su excelente solubilidad en fertirrigación tanto en riego localizado como a manta) y en todos los cultivos que presenten carencia de hierro. Se recomienda utilizarlo principalmente al comienzo de la actividad vegetativa, para asegurar una buena brotación, floración y cuaje, aunque dependiendo del grado de clorosis se pueden realizar aplicaciones durante todo el ciclo vegetativo.

ALMACENAMIENTO

Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA Teléfono 915 620 420

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.



Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

DOSIS
Las dosis de aplicación dependen de varios factores como: tamaño de la planta, intensidad de la clorosis, condiciones de terreno, etc.

CULTIVOS	INCORPORACIÓN AL SUELO	RIEGO POR GOTEO
FRUTALES, CÍTRICOS, AVELLANO Y OTROS LEÑOSOS		
Viveros	2,4 g/m^2	2,4 g/m^2
Plantones	5-10 g/árbol	3-10 g/árbol
Árboles jóvenes o espaldera	15-20 g/árbol	10-15 g/árbol
Árboles en producción	30-40 g/árbol	20-30 g/árbol
Árboles muy afectados por clorosis o muy desarrollados	60-90 g/árbol	40-60 g/árbol
PARRAL Y PLATANERA	15-20 g/pie	10-12 g/pie
VIÑEDO		
Cepas jóvenes	3-5 g/pie	2-3 g/pie
Cepas desarrolladas	5-10 g/pie	3-6 g/pie
FRESAL	5-7 kg/ha	
HORTÍCOLAS Y ORNAMENTALES		
Inicio de desarrollo	3-5 g/m^2	0,5-1 g/m^2
Pleno desarrollo	5-10 g/m^2	1-2 g/m^2

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.