FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

VOLCK MISCIBLE BLUE

Insecticida para el control de Mosca Blanca, Pulgón, Ácaros y Cochinillas
Concentrado emulsionable (EC)

Composición:
Aceite de parafina ……..83% p/v (830 g/L)
(CAS 8042-47-5)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el núm. **13074**

Registrado por:
LERIDA UNION QUIMICA, S.A.
C/Afores s/n
25173 Sudanell
Lleida. (ESPAÑA)

Distribuido por:
FMC Agricultural Solutions, SAU
Paseo de la Castellana, 257 – 5ª planta
28046 Madrid
www.fmcagro.es

ANTES DE UTILITZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso

FITOSANITARIO UTILIZABLE EN PRODUCCIÓN VEGETAL ECOLÓGICA SEGÚN R (UE) 848/2018 CONFORME A LA NORMA UNE 315500

Este producto se encuentra registrado como insumo por FIBL y cumple la normativa de Demeter Internacional

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions
S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

UFI: 1C00-X01G-E00F-FKM6



ATENCIÓN

H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261	Evitar respirar la niebla de la pulverización.
P280	Llevar guantes y prendas de protección.
P391	Recoger el vertido
P501	Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

El contacto y/o ingesta de grandes cantidades puede provocar:

- Irritación pulmonar por aspiración o inhalación.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Control de electrolitos
- Contraindicación: Catárticos.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions
S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Mitigación de riesgos medioambientales
Spe3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:
- 15 m para almendro, frutales de hueso y de pepita, avellano, caqui, castaño, granado, kiwi, mango, nogal, pacano, nuez de Pecán.
- 20 m para cítricos, aguacate y kumquat.
- 30 m para platanera.
Spe3: Para proteger a los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m para platanera hasta la zona no cultivada.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Mitigación de riesgos en la manipulación
Seguridad del aplicador:
- Mezcla, carga, limpieza y mantenimiento del equipo:
  Para pulverizaciones manuales y con tractor:Ropa de trabajo y guantes de protección química.
- Aplicación:
  Para pulverizaciones con tractor: Ropa de trabajo.
  Para pulverizaciones manuales: Ropa de trabajo y guantes de protección química.

Seguridad del trabajador:
- Ropa de trabajo (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada).

Frases asociadas a la reduccion del riesgo:
- Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
- Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Eliminación del producto y/o caldo:
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU RECIPIENTE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.
.

Gestión de envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Características

VOLCK® MISCIBLE BLUE es un insecticida para el control de cochinillas, moscas blancas, ácaros y pulgones en diversos cultivos.

Aplicaciones y dosis autorizadas

Cultivo	Acción	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Volumen Caldo	Momento de aplicacion
Almendro **Frutales de hueso** **Frutales de pepita** (2)	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,75 - 1 % 6-10 l/ha	1	-	800-1.000 l/ha	Tratar antes de la floración, hasta BBCH 59
Cítricos (1)	Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Moscas blancas, Aleyrodidae	1 - 1,5 % 20-45 l/ha	2	10	2.000-3.000 l/ha	Tratar antes del cambio de color de los frutos, hasta BBCH 79
Platanera	Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Moscas blancas, Aleyrodidae	1 - 1,5 % 15-45 l/ha	1	-	1.500-3.000 l/ha	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo

(1) Cítricos: Naranjo, limonero, pomelo, mandarino, clementino.
(2) Frutales de pepita: Manzano, peral, membrillero, níspero

Usos menores (art. 51 del Reglamento (CE) nº 1107/2009)

Cultivo	Acción	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Volumen Caldo	Momento de aplicacion
Aguacate **Kumquat**	Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Moscas blancas, Aleyrodidae	1 - 1,5 % 20-45 l/ha	2	10	2.000-3.000 l/ha	Tratar antes del cambio de color de los frutos, hasta BBCH 79

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Cultivo	Acción	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Volumen Caldo	Momento de aplicacion
Avellano, Caqui Castaño Granado Kiwi Mango Nogal Pacano, nuez de Pecán	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae	0,75 - 1 % 6-10 l/ha	1	-	800-1.000 l/ha	Tratar antes de la floración, hasta BBCH 59

*Con respecto a los usos menores autorizados la responsabilidad en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor recaerá sobre la persona que utilice el producto fitosanitario tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del Reglamento (CE) 1107/2009.

Modo de empleo

- Aplicar en pulverización normal con un volumen de agua suficientemente alto para alcanzar la parte aérea de las plantas.
- No aplicar este producto hasta pasados 40 días después de haber dado un tratamiento con azufre ni cuando se prevean heladas ni en días calurosos y secos.
- No debe aplicarse en condiciones de estrés hídrico.
- Aplicar en plantas sanas y vigorosas.

Plazo de seguridad

No procede

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.