**FMC Agricultural Solutions S.A.U**
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

# SEAMAC® RHIZO

**ABONO LÍQUIDO NPK (4-4-3) CON EXTRACTO DE ALGAS Y AMINOÁCIDOS, con Boro (B), y/o Cobre (Cu), y/o Hierro (Fe), y/o Manganeso (Mn), y/o Molibdeno (Mo), y/o Zinc (Zn)**
**Abono Hidrosoluble para fertirrigación y aplicación foliar.**

**Contenido declarado:**

| | |
|---|---|
| Nitrógeno (N) total..... | 4% p/p |
| Nitrógeno (N) orgánico: | 4% p/p |
| Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en agua..... | 3,9% p/p |
| Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua..... | 2, 2% p/p |
| Boro (B)..... | 0,09% p/p |
| Cobre (Cu)..... | 0,02% p/p |
| Hierro (Fe)..... | 0,04% p/p |
| Manganeso (Mn)..... | 0,09% p/p |
| Molibdeno (Mo)..... | 0,01% p/p |
| Zinc (Zn)..... | 0,08% p/p |
| Manitol..... | 0,4%p/p |
| pH..... | 4 |
| Conductividad eléctrica..... | 36,5 dS/m |

**Materias primas de origen orgánico:**
Extracto de Algas *Ascophyllum nodosum*..... 11,2% p/p
Aminoácidos libres (origen soja)..... 18% p/p
**Aminograma cualitativo:**
Ácido glutámico: 5,4% p/p
Lisina (Lys).....7,8% p/p
**Proceso seguido para la obtención de los aminoácidos:**
Hidrólisis de proteínas
Clase A
Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación

UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.
NO SOBREPASAR LAS DOSIS RECOMENDADAS

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO**

*Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales*

Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso

**Distribuido por:** FMC Agricultural Solutions, S.A.U.
Pº de la Castellana nº 257 5º. 28046 MADRID
Tel: 915530104



Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

**FMC Agricultural Solutions S.A.U**
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

Fabricado por:
FMC Agro Limited, Rectors Lane, Pentre, Flintshire CH5 2DH. Reino Unido.
Tel: +44 1244 537370, www.fmc-agro.co.uk

UFI: VP91-03U8-XN4H-KD7U



PELIGRO
H290: Puede ser corrosivo para los metales.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H360FD: Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102. Manténgase fuera del alcance de los niños.
P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.
P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
Contiene ácido bórico
EUH 208: Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta**

**MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO**
Durante el uso, preparación de la mezcla y aplicación del producto, utilice equipo de protección personal.

SP1. NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.



Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

**CARACTERÍSTICAS**

SEAMAC® RHIZO es una solución de extracto natural de *Ascophyllum nodosum* enriquecida con aminoácidos y elementos nutricionales, actúa mejorando la calidad de la cosecha, consiguiendo un establecimiento más rápido del cultivo en campo y su recuperación ante situaciones de estrés abiótico o alta demanda como plena producción, además de favorecer la absorción de nutrientes del suelo.

**CULTIVOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

| Cultivos | Dosis | Momento de aplicación |
|---|---|---|
| Cítricos | 2,5 – 5 l/ha en agua de riego | 1er tratamiento a inicio de brotación (5 l/ha), repetir tratamientos tras cuaje del fruto (2,5 l/ha) y durante el engorde (2,5 l/ha). En situaciones de estrés o alta demanda. |
| Frutales | 2,5 – 5 l/ha en agua de riego | 1er tratamiento a inicio de brotación (5 l/ha) y 1-2 tratamientos durante el engorde del fruto (2,5 l/ha). En situaciones de estrés o alta demanda |
| Olivo | 2,5 l/ha (olivar tradicional) – 5 l/ha (olivar intensivo) en agua de riego, o pulverización foliar 0,2% | Tratamientos a inicio de nueva brotación (aprox. Marzo) e inicio de engorde del fruto. En situaciones de estrés o alta demanda. |
| Hortícolas invernadero o aire libre, fresa | 2 – 3 l/ha en agua de riego | 1er tratamiento tras transplante, repetir tratamientos cada 15-20 días o cuando se prevea una situación de estrés o alta demanda. Al menos 3 tratamientos por ciclo de cultivo |
| Alcachofa | 2 – 3 l/ha en agua de riego | 1er tratamiento a inicio de brotación (brotes de 10 cm), repetir 2 tratamientos cada 15-20 días. En situaciones de estrés o alta demanda |
| Patata | 2 – 3 l/ha en agua de riego, o pulverización foliar 0,2% | 1er tratamiento con las primeras hojas extendidas, repetir 2 tratamientos cada 15-20 días. En situaciones de estrés o alta demanda |
| Cebolla | 2 – 3 l/ha en agua de riego, o pulverización foliar 0,2% | 2 tratamientos espaciados 20 días a inicio de cultivo. En situaciones de estrés o alta demanda |
| Viña y uva de mesa | 2 – 3 l/ha en agua de riego, o pulverización foliar 0,2% | 1er tratamiento a inicio de brotación (brotes de 5 a 10 cm), 2-3 tratamientos durante alargamiento de racimos y engorde. En situaciones de estrés o alta demanda |
| Algodón | 1,5 – 2 l/ha en agua de riego o pulverización foliar | 1er tratamiento tras emergencia del cultivo, repetir 2-3 tratamientos cada 20 días. En situaciones de estrés o alta demanda |
| Cereal, maíz y girasol | 1,5 – 2 l/ha en agua de riego o pulverización foliar | 1-2 tratamientos a inicio de cultivo tras emergencia. En situaciones de estrés o alta demanda |
| Arroz | 1,5 – 2 l/ha | 1er tratamiento con 3-4 hojas, 2º entre fin de ahijamiento y aparición de hoja bandera. En situaciones de estrés o alta demanda |
| Viveros y nuevas | 5 – 10 ml/plantón en agua de | Tratamientos tras trasplante en campo cada 20 |



Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

FMC Agricultural Solutions S.A.U
Pº de la Castellana, 257 – 5º
28046 Madrid
España

+34 915 530 104
fmcagro.es

| | | |
|---|---|---|
| plantaciones de leñosos | riego, o pulverización foliar 0,2% | días, o en viveros durante desarrollo vegetativo |
| Ornamentales herbáceas y leñosas | 2 – 3 l/ha en agua de riego, o pulverización foliar 0,2% | Tratamientos cada 15-20 días |

**COMPATIBILIDAD**

**SEAMAC RHIZO** es compatible con un amplio número de productos. Para cualquier duda con respecto al uso de este producto, contacte con nuestro Departamento Técnico.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Proteger de las heladas. Almacenar a una temperatura superior a 5°C.
Mantener alejado de la luz solar directa. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
No reutilizar el envase.

**ADVERTENCIA**

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc) La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

**GESTIÓN DE ENVASES**

Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.